


EN EL DÍA DE LAS MADRES, RECORDEMOS QUE...

**MÁS DE 500 MUJERES  
MUEREN AL AÑO  
EN COLOMBIA POR  
CAUSAS EVITABLES  
RELACIONADAS CON  
SU EMBARAZO**

**Cada minuto en el mundo:**

- + Muere una mujer embarazada.
- + **100** mujeres sufren complicaciones relacionadas con el embarazo.
- + **200** mujeres adquieren una infección de transmisión sexual
- + **300** mujeres salen en embarazo sin planearlo ni desearlo.





## Bogotá, 5 de mayo de 2010.

Con motivo de la celebración del Día de las Madres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) felicita a cada una de las madres colombianas, y reconoce el papel vital que cumplen para el desarrollo de las familias y la sociedad.

Sin embargo, es importante recordar a todas las mujeres que han muerto por causas relacionadas con su embarazo y parto, y el vacío que han dejado en sus familias y sus hijos. Cerca del 98% de las muertes de mujeres embarazadas son evitables.

La mortalidad de mujeres gestantes continúa siendo un preocupante problema de salud pública en Colombia y, a la vez, una situación de vulneración de los derechos a la salud y a la vida de las mujeres


A pesar de ser un país donde el 97% de los partos son atendidos en instituciones de salud (y no en la casa), persisten problemas de calidad en los servicios, que se traducen en una razón de mortalidad de mujeres gestantes de 75,6 muertes por cien mil nacidos vivos (año 2007), una cifra muy alta comparada con el nivel de desarrollo de Colombia.

La mortalidad materna constituye un indicador de las desigualdades sociales existentes entre países, y entre regiones. En Colombia existen diferencias territoriales que confirman la relación entre la desigualdad social y la muerte de mujeres gestantes, por ejemplo, mientras que en Antioquia mueren cerca de 42 mujeres por cada cien mil nacidos vivos, en Chocó mueren cerca de 200 mujeres.

La evidencia ha demostrado que existen 3 demoras en la atención de una mujer gestante que pueden desencadenar su muerte:

1) Demoras en tomar la decisión de acudir al centro de salud a tiempo, en buena medida por falta de información y reconocimiento de los derechos de las mujeres gestantes, y por condiciones culturales de subvaloración de las necesidades de las mujeres (se subvaloran los síntomas y signos de alerta, por ejemplo, por parte de la familia, las parejas, etc.)

2) Demoras llegar al centro de salud, relacionado con barreras geográficas entre el centro de salud y la vivienda de las mujeres, dificultades económicas, etc.



3) Demoras en la atención, relacionado con barreras administrativas que dificultan el acceso oportuno a una atención especializada y de calidad. La mayoría de los eventos de mortalidad de mujeres a causa de la maternidad se producen por fallas en la calidad de la atención médica y hospitalaria, expresada en un servicio ineficiente y no especializado del embarazo, el parto y el postparto.

## Prevenir la mortalidad materna

La prevención de la mortalidad materna depende, en gran medida, del compromiso del Estado, de las instituciones de salud y de la sociedad en la promoción del derecho de las mujeres a un embarazo y un parto seguro y digno, mediante acciones como:

1) mejoramiento de la infraestructura de las instituciones de salud, en materia de servicios obstétricos especializados, 2) control y vigilancia estatal efectivos a los prestadores de servicios de salud, 3) creación de un marco jurídico y legislativo que proteja los derechos de las mujeres gestantes, 4) investigación de las causas de las muertes y sanción de las personas responsables cuando se trate de fallas en la atención en salud, 5) capacitación al personal de salud que atiende mujeres gestantes, 6) difusión de información a las mujeres sobre sus derechos, 7) satisfacción de necesidades básicas de las mujeres gestantes en nutrición, sanidad, vivienda, educación, seguridad social, entre otras, y 8) mejor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a planificación familiar.

## Mortalidad materna y embarazo en adolescentes

El riesgo de muerte materna es el doble cuando se trata de partos en adolescentes, en comparación con mujeres adultas. En Colombia el 22% de las adolescentes ha estado alguna vez embarazada, y esta cifra alcanza el 30% en adolescentes desplazadas. Lo anterior, indica la necesidad de fortalecer el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y de educación sexual para adolescentes, tanto mujeres como hombres, para que puedan tomar decisiones informadas sobre la sexualidad, y hacer uso de métodos anticonceptivos seguros.



Adicionalmente, garantizar atención en salud de calidad para las adolescentes embarazadas que les permita tener partos seguros, y planificar sus siguientes embarazos, en caso de desearlos.

## Estadísticas

### En el mundo:

- 536 mil mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. De estos casos, el 99.34% ocurren en los países en vías de desarrollo.
- Desde 1990 hasta la fecha se ha logrado disminuir solo el 1% anual.
- Uno de los Objetivos de desarrollo del Milenio es “reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna”.

### Colombia:

- Es el cuarto país de Suramérica con el índice más alto de mortalidad materna, después de Bolivia, Perú y Paraguay.
- Las causas de muerte materna más frecuentes son: hipertensión inducida por el embarazo (32%), hemorragia (25%), shock séptico (10.7%)
- Los departamentos con mayores índices de mortalidad materna son: Chocó, Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare y Caquetá.

### Mayor información para prensa:

Gema Granados Hidalgo

Asesora en Comunicaciones

Cel: 320 3337965 - 320 2359569

[granados@unfpa.org](mailto:granados@unfpa.org)



Fondo de Población  
de las Naciones Unidas